

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ
НЕМЦЕВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
INTERNATIONALE GEORG-WILHELM-STELLER-GESELLSCHAFT
MARTIN-LUTHER-UNIVERSITÄT HALLE-WITTENBERG
ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
РОССИЙСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
ТЮМЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

AUS SIBIRIEN — 2019

НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ СБОРНИК

Тюмень
Издательство
Тюменского государственного университета
2020

УДК 39:008(571.120=122.2)+908(571.120)
ББК Т521(253.3=432.4)-7+Д890(253)
А93

Редакционная коллегия:

А. П. Ярков — доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Экспертного научного центра противодействия идеологии экстремизма и терроризма Тюменского государственного университета, г. Тюмень, Россия (гл. ред.)

Д. А. Гоголев — кандидат исторических наук, доцент, старший преподаватель кафедры археологии, истории Древнего мира и Средних веков Института социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета, г. Тюмень, Россия

А. В. Хригель — председатель Совета ОО «Региональная национально-культурная автономия немцев Тюменской области», г. Тюмень, Россия

Н. Охотина-Линд — PhD, доцент Института межкультурных и региональных исследований Университета Копенгагена, г. Копенгаген, Дания

Ф. Липпольд — научный сотрудник Franckesche Stiftungen, г. Галле, Германия

В. Хинтцше — Dr., научный сотрудник Franckesche Stiftungen, г. Галле, Германия

В. В. Полищук — исследователь локальной истории, г. Тюмень, Россия

Рецензенты:

А. Г. Еманов — доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой археологии, истории Древнего мира и Средних веков Института социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета

Г. С. Зайцев — кандидат исторических наук, директор Центра региональных справочных изданий Тюменского государственного университета

AUS SIBIRIEN — 2019 : научно-информационный сборник / Тюменский государственный университет. — Тюмень : Издательство Тюменского государственного университета, 2020. — 168 с.

ISBN 978-5-400-01581-6

Научно-информационный сборник включает материалы X Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Стеллеровские чтения» (21 сентября 2019 г., Тобольск, Россия), Международной научной конференции «24. Deutsch-Russische Begegnungen» (27–30 сентября 2018 г., Галле, Германия), Международной научной конференции «25. Deutsch-Russische Begegnungen» (3–6 октября 2019 г., Галле, Германия).

Адресуется специалистам в области истории и краеведения, а также широкому кругу читателей.

УДК 39:008(571.120=122.2)+908(571.120)
ББК Т521(253.3=432.4)-7+Д890(253)

В оформлении обложки использованы фотографии Д. А. Гоголева, сделанные в г. Галле (Германия) в 2019 г.

ISBN 978-5-400-01581-6

© Тюменский государственный университет, 2020

РЫБЫ, НАЗВАННЫЕ В ЧЕСТЬ СТЕЛЛЕРА

Аннотация. На сегодняшний день имя Стеллера закреплено в трех легитимных видовых и одном родовом названии рыб. Из них терпуг и бычок были впервые собраны самим натуралистом, а малорот и лисичка стеллерина — более поздними исследователями. В сборах Стеллера также присутствовали круглопер, алепизавр и волосозуб. Самостоятельность *Cyclopterus stelleri* не была подтверждена. Попытки связать алепизавра и волосозуба с именем Стеллера не увенчались успехом, хотя первые научные описания принадлежали ему.

Ключевые слова: Стеллер, рыба, бинарная номенклатура, латынь, древнегреческий, местные названия.

Abstract. Today the name of Steller is fixed in 3 legitimate species names and one generic name of fish. From these, the greenling and sculpin were first-collected by the naturalist himself, while blackfin flounder and poacher-stellerina — by later researchers. In Steller's collection were also smooth lumpfish, lancetfish and pacific sandfish. Independence of *Cyclopterus stelleri* wasn't confirmed. All attempts to associate lancetfish and sandfish with the name of Steller were unsuccessful, although the first scientific descriptions belonged to him.

Key words: Steller, fish, binary nomenclature, Latin, ancient Greek, local names.

В настоящее время удалось выявить 1 род и 6 видов рыб, названия которых так или иначе связаны с именем неутомимого исследователя, участника Второй Камчатской экспедиции Георга Вильгельма Стеллера (1709–1746). Четыре из них содержат корень *steller* — в современных латинских названиях; один (*Cyclopterus stelleri*) в начале XIX в. был выделен в отдельный вид, но в дальнейшем его самостоятельность не получила подтверждения; другому (*Alepisaurus ferox*) с середины XIX в. пытались вернуть данное Стеллером родовое имя, а в качестве видového использовать слово «эскулап», указывающее на должность натуралиста (*Plagiodus Aesculapius* и др.), но ни один из предложенных вариантов не укоренился. Последний (*Trichodon stelleri*, совр. *T. trichodon*) в русскоязычный список «стеллеровских видов» включен впервые, хотя в XIX в. вокруг этой темы шли бурные дебаты. Отказ от версии видového названия, содержащей имя первооткрывателя, как нельзя лучше иллюстрирует, насколько несправедливыми бывают повороты истории. Имя человека, по сути описавшего новый род (формально это сделал Тилезиус), давшего ему укоренившееся впоследствии название и предвосхитившего классификационную иерархию оказалось отвергнуто. Подобные ситуации не раз случались как при жизни Стеллера, так и после его смерти. Этого нельзя изменить, но можно восполнить информационные пробелы.

Терпуг Стеллера — *Hexagrammos stelleri* (Tilesius, 1810)

В российских дальневосточных водах представлены два рода семейства Терпуговых — *Hexagrammos* и *Pleurogrammus*. И тех, и других называют терпугами (только на Командорах *P. monopterygius* известен как «судачок»). Своим названием рыба обязана шероховатой, как бы наждачной поверхности, обусловленной наличием зубчиков на чешуе. Устаревшее слово *терпуг* (на камчадальский манер произносившееся *терпук*) означает «напильник». Первым эту лингвистическую особенность подметил Степан Крашенинников. Позже латинское «*lima*», имеющее тот же перевод, применяли Петр Симон Паллас и Вильгельм Тилезиус.

Стеллер, в отличие от обывателей, акцентировал внимание не на тактильных ощущениях, а на расцветке: терпуг «представляет собою очень красивую, различной окраски рыбу, отмеченную 12 полосками, по 6 с каждой стороны» [29, с. 133]. На правах первооткрывателя он дал группе название *Dodecagrammos*, что так и переводится, «двенадцатиполосый». Крашенинникову не довелось увидеть рыбу живой. Разглядеть сложную гамму цветов в высушенном образце было проблематично, и он ограничился цитированием наставника: «по описанию

Стеллера спина у них черноватая, бока красноватые, серебряными пятнами распестренные, из которых иные четверугольные, иные продолговатые, а иные круглые. Видом походит она на окуня» [26, с. 299; 11, р. 397–398; 16, р. 286]. Советский ихтиолог Л. С. Берг полагал, что под *Dodecagrammos* мог скрываться описанный Палласом из Авачинской гавани терпуг восьмилнейный (*H. octogrammus*), сам же Паллас отмечал многообразие признаков внутри группы и необходимость дальнейшего, более детального исследования [16, р. 287].

Стеллер неоднократно наблюдал морскую рыбалку. Обычно терпугов промышляли в районе Авачинской бухты и со стороны Курильских островов. Крючки для удилищ делали из чайных костей или прочной древесины. Готовое блюдо было по вкусу даже европейцам. Натуралист засушил несколько коллекционных образцов. По одному из них, собранному 20 мая 1741 г. в «бухте Святых Петра и Павла», Тилезиус сделал описание нового вида *Hexagrammos stelleri* [11, р. 335–344]. Материал был дополнен собственными наблюдениями естествоиспытателя, летом 1804 г. изучавшего ихтиофауну Камчатки в составе экспедиции И. Ф. Крузенштерна. Паллас рассматривал вид как *Labrax hexagrammus* с ремаркой, что у Стеллера он назван *Hexagrammus asper* [11, р. 395–398; 16, р. 284–285] («шестиполос» шершавый). Оба описания вошли во 2 том «Mémoires de l'Académie...», но Тилезиус закончил описание ко 2 ноября 1808 г., а Паллас — только к 5 июля 1809 г. Первое оказалось более полным и точным, зато второе содержало полный текст Стеллера, фрагмент которого процитировал Крашенинников. Более подробное описание сделали в 1898 г. Д. Джордан и Б. Эверманн [7, р. 1871–1872].

Имя Стеллера закрепилось в латинском названии вида, но не вошло в обиход. В России рыбу называют пятнистым терпугом, в Северной Америке — whitespotted greenling, и только в Польше говорят *terpuga stelleri*.

Бычок Стеллера — *Myoxocephalus stelleri* (Tilesius, 1811)

Myoxocephalus stelleri — один из видов лучеперых рыб семейства Рогатковых (*Cottidae*) отряда Скорпенообразных (*Scorpaeniformes*). Он встречается в северной части Тихого океана — от Алеутских островов до Охотского и Японского морей и обитает на глубинах до 60 м. Нередко рыба заходит в устья рек, а молодь держится в зоне отлива. Вид имеет много названий: мраморный **керчак**, **япономорский/дальневосточный керчак**, **бычок/керчак Стеллера**, **стеллерова широколобка** и т. д., в англоязычной версии это главным образом *frog sculpin*. Керчаки также известны как «бычки-подкаменщики». В XVIII в. русские называли их «быками», а камчадалы — «яхо». Латинских синонимов не меньше: *M. decastrensis* (Kner, 1865), *Cottus mertensii* (Cuv. et Val., 1831), *C. niger* (Bean et Bean, 1896), и др.

Обилие названий косвенно свидетельствует о полиморфности вида. Первое время, когда коллекционных образцов было недостаточно, систематики испытывали серьезные сложности с выявлением устойчивых признаков. Описывая новый вид *M. stelleri* [12, р. 273–278, tab. XII], Тилезиус задавался вопросами: является ли наличие и размеры гребней и бугров на голове видовым признаком или они связаны с половозрастными особенностями? Принадлежат ли различные по расцветке бычки рек Авачи и Большой к разным видам или это вариететы одного?

В своих рукописях Стеллер упоминал о **трех бычках**: **Scorpio marinus** (скорпионе морском), *Cottus aleopidotus/alepidotus* (бычке бесчешуйном) и *Cottus Hiekejak* (совр. *Hemilepidotus*). «...к вечеру [2 августа 1741 г.] я удочкой поймал две рыбы, называемые *Scorpius marinus*, которых описал и заспиртовал; они утратились со многими другими коллекциями, когда корабль в ноябре выбросило на сушу», — писал натуралист в дневнике плавания к берегам Америки [28, с. 52, 173]. В комментариях к тексту А. К. Станюкович ошибочно указал атлантического *M. scorpius*. Согласно Тилезиусу, это мог быть *M. stelleri*. На внешнее сходство двух видов указывал и П. Ю. Шмидт: «Вид этот [*M. stelleri*], очень близкий к атлантическому *M. (Cottas) scorpius* L., <...> отличается от него более сильным развитием гребней и бугров на

голове, иною формою головы, более сильною бородавчатостью <...> и [пропорциями тела]» [31, с. 76–78].

Керчак Стеллера обычен для акватории Камчатки и Командорских островов. Мальки нередко встречаются в литоральных ваннах нижнего и среднего горизонтов о. Беринга. Нет сомнений, что Стеллер собирал коллекционные образцы данного вида.

О камчатских рыбах натуралист сообщил следующее: «Быки представляют собою рыб с двумя рогами или большими иглами на голове; видом своим быки похожи на колючеперых, или *Uranoscopi*; их ловят весною в Авачинском заливе, и я велел срисовать одного быка, а также храню один экземпляр его в спирту» [29, с. 135]. Это наблюдение интересно, но недостаточно для описания сложной в систематическом отношении группы. Первые фундаментальные сборы провел Тилезиус во время пребывания шлюпа «Надежда» на Камчатке.

Малорот Стеллера — *Glyptocephalus stelleri* (Schmidt, 1904)

Малорот Стеллера, или дальневосточная малоротая камбала, является одним из промысловых видов Японского моря. Также его можно встретить в Татарском проливе, акватории Курильских островов, Охотском и Беринговом морях (близ Командорских островов не отмечен). Обычно рыба держится на глубине 15–800 м.

От других малоротов стеллеров отличается удлинённым туловищем, характерной зубной формулой и коротким грудным плавником. Оба глаза расположены на правой стороне. Тело просвечивающее, сверху светло-коричневое, снизу серое. Плавники черноватые, за что в Северной Америке его называют blackfin flounder.

Описание вида сделал в 1904 г. российский ихтиолог Петр Юльевич Шмидт. Первый экземпляр был выловлен им 24 мая 1900 г. близ о. Аскольда в заливе Петра Великого (Японское море). Глубина траления составляла около 70 м, вместе с камбалой с песчаного заиленного дна были подняты голотурии, крабы, сепиола и др. гидробионты. В июне малороты попадались у берегов Сахалина и Корейского полуострова. Одномачтовый «Гонец», предназначенный для инспектирования берегов чиновниками лесной охраны Приамурского края, обладал слабыми мореходными качествами. Сидеть в крохотной каюте можно было лишь согнувшись и всякий раз, вставая, приходилось высовывать голову в люк. Но стесненные условия не помешали зоологам выполнить огромный объем работ.

Новый вид был назван *Microstomus stelleri* [31, с. 44, 247–249]. *Microstomus* так и переводится — «малорот». Выделенный позднее род *Glyptocephalus* трактуется как «длинная камбала», но в основе имеет два древнегреческих слова: *γλυπτός* — «вырезанный» и *κεφάλι* — «голова». Видовое название *stelleri* следует расценивать как дань уважения — сам натуралист эту камбалу не встречал. «Сей рыбы четыре рода Стеллером примечено, в том числе у одного глаза на левой стороне, а у прочих на правой: у которого глаза на левой стороне, на том кожа сверху черноватая и косточками как звездками распестренная <...> Из прочих на первом кожа с обеих сторон гладка, токмо на шаглах косточки; на другом кожа с обеих сторон с косточками, и сей последней род называется в России палтусом», — писал Крашенинников [26, с. 298]. В тексте легко узнается звездчатая и четырехбугорчатая камбала. Третья вызывает сомнения, но это в любом случае не наш малорот.

Во времена Второй Камчатской экспедиции камбалу на Камчатке называли «плоской рыбой» (по-иттельменски *сюхслот* (по Стеллеру) и *сыгызых* (по Крашенинникову); по-корякски *алта* (по Крашенинникову), *альпеаль* [29, с. 135; 26, с. 329; ПМА: Аслапова (Аймык) Л. А., 14.08.2019]). Обычно ее выбрасывали из сетей и не брали даже на корм собакам. Любителей внести разнообразие в пищевой рацион было немного. Тем интереснее подмеченное Стеллером ительменское поверье, что из двух яиц речной чайки, снесенных в обустроенное на суше

гнездо, из одного вылуплялся птенец, а из другого — камбала [29, с. 159]. При ничтожном промысловом значении камбала являлась заметным фольклорным объектом.

«Колючий бандит» — *Stellerina xyosterna* (Jordan et Gilbert, 1880)

Морская лисичка стеллерина — небольшая (до 16 см длины) придонная рыбка, предпочитающая песчаные и песчано-илистые грунты на глубинах от 5 до 75 м. Она встречается вдоль восточного побережья Тихого океана от бухты Ледяной (Icy Bay) на Аляске и мыса Файф (Fife Point) на островах Королевы Шарлотты до залива Сан-Карлос Нижней Калифорнии [18, p. 50].

Описание вида было сделано 20 апреля 1880 г. американскими зоологами Дэвидом Джорданом и Чарльзом Гилбертом по единственному известному образцу из ихтиологической коллекции Национального музея США. Экземпляр был найден на пляже Санта-Круз доктором К. Л. Андерсоном [8, p. 152–154]. Внешне он напоминал более распространенную лисичку *Chesnonia verrucosa* (Lockington, 1880). В первой версии рыба была названа не стеллериной, а *Brachyopsis xyosternus*. Двумя месяцами позже, 15 июля 1880 г., австрийский зоолог Франц Штейндахнер опубликовал описание того же вида под именем *Agonus annae* (Steindachner, 1880). Но название *Brachyopsis xyosternus* содержало грамматическую ошибку — по правилам латинского языка словосочетание женского рода звучит *Brachyopsis xyosterna*. Ее следовало исправить, и в 1895 г. списке «рыб и рыбопообразных позвоночных Северной и Средней Америки» Дэвида Джордана и Бартон Эверманна появилась современная версия — *Stellerina xyosterna* [6, p. 447]. Родовое название *Stellerina* ввел Франк(?) Крамер (Cramer). Бесспорно, оно посвящено Стеллеру, поскольку приблизительно в то же время (не позднее 1895 г.) в названии другого рода того же семейства Агонид Крамер запечатлел имя Палласа — *Pallasina*.

В повседневной жизни лисичку редко называют стеллериной, обычно это pricklebreast roacher (в португальской версии bandido pechoespinoso) — «колючий бандит».

Круглопер Стеллера

Одним из устаревших, вышедших из употребления синонимичных названий *Aptocyclus ventricosus* (Pallas, 1769) является круглопер Стеллера — *Cyclopterus stelleri*. Паллас включил этот вид как отдельный в третий том «*Zoographia Rosso-Asiatica*» (с атрибуцией времени издания «Зоографии» существуют разночтения: первые два тома вышли в 1811 г., датой публикации 3-го принято считать 1814 г., ранее его датировали 1811 и 1831 гг.; сама рукопись была завершена в 1810 г., незадолго до смерти автора).

Описание базовой формы было сделано им 40 годами ранее — в «*Spicilegia zoologica*» за 1769 г. [14, p. 15–18] В основу легли полевые записи Стеллера и высушенный экземпляр, хранившийся в Петербургском музее. Стеллер был первым натуралистом, собравшим коллекционный образец и наблюдавшим это странное создание в живой природе — на Камчатке и о. Беринга. Он называл рыбу Daechpu (*Daechpu kamtschadalarum*). Возможно, название родственно древнегреческому *δάκρυον* — «капля, слеза». Паллас предпочел вариант, более четко отражающий внешние признаки — *Cyclopterus ventricosus*. *Cyclos* (*κύκλος*) переводится как «круг», *pterus* (*πτερόν*) — «крыло»; *ventriculus* — «брюшко». Позже Паллас разбил вид на два: *C. ventricosus* и *C. stelleri*. Для первого он привел стеллеровское название Daechpu и отметил, что вид обычен для литорали восточного океана. Для второго дал определение «*cyclopterus glaber*» (круглопер гладкий), связал с цитатой из дневника Стеллера и добавил, что рыбу приносит к берегам полуострова крайне редко. В основу описания *C. stelleri* лег тот самый образец, собранный Стеллером в окрестностях Петропавловска. Но он был сильно деформирован в результате сушки и хранения.

Впоследствии многие ихтиологи искали круглопера Стеллера и приводили его под разными названиями. В 1861 г. Альберт Гюнтер (Günther) включил оба вида в род *Cotylin* [5, p. 498–

499]. В 1892 г. американский ихтиолог Самуэль Гарман выделил *C. stelleri* в отдельный род *Liparops stelleri* [4, р. 42–43]. Это название приводили В. И. Грацианов (1907 г.), В. К. Солдатов и Г. У. Линдберг (1930 г.), А. Я. Таранец (1937 г.), А. П. Андрияшев (1939 г.) и др. Слово *liparops* также имеет древнегреческий корень, его перевод сопоставим с бытующим народным названием «мяконькая». В 1881 г. Ф. Штейндахнер описал новый, как ему казалось, вид *Cyclopterychthys glaber* [20, р. 192–193, tab. VIII], это родовое название некоторые зоологи использовали вплоть до конца XIX в. В 1897 г. управляющий Командорскими островами Николай Гребницкий внес в список рыб *Cyclopterychthys ventricosus* и *C. Stelleri* [16, р. 73–74], попутно исправив грамматические ошибки в родовом названии. Однако все усилия доказать самостоятельность *C. stelleri* оказались тщетны. Он был признан невалидным, а перечисленные названия расценены как синонимичные современному *Aptocyclus ventricosus*.

Обычно круглопер обитает на глубинах до 1,5 км, но весной во время нереста он поднимается в зону отлива. Благодаря видоизмененным в форме диска грудным плавникам он прочно «присасывается» к камням и никогда не попадает в сети. Во времена Стеллера местные жители ели его в сыром и вареном виде, вызывая брезгливость европейцев. В 1897 г. Гребницкий писал: «Отвратительная на вид и вкус рыба охотно поедается жителями вареною. **Ход ея — март и апрель. Мечет крупную зернистую икру, покрытую твердою оболочкою, склеивая кучею в расщелинах скал и небольших углублениях под камнями.** На деле неприятен только внешний вид рыбы, по вкусу она напоминает холодец.

Специфическая внешность, напоминающая бесформенного уродливого головастика, породила соответствующее поверье. Паллас писал, что аборигены Камчатки вменяли рыбе в вину «похотливое кровосмешение». Считалось, что круглоперы смотрят снизу вверх на «сокровенные места под платьями проходящих по литорали женщин», и их взгляды всегда исполнены развратного желания [14, р. 16; 17, р. ССХ–ССХI]. Примечательно, что эротические свойства приписывали и другому обитателю тихоокеанских вод, круглоперу шаровидному (*Eumicrotremus orbis*). Алеуты верили, что рыбка способна излечить женщину от бесплодия. Стоило только незаметно подложить ее «под место, на которое сядет женщина», и первое после этого совокупление принесет зачатие [24, с. 333].

Палласа больше заинтересовало представление населения (в публикации 1769 г. он указал курильцев; 1814 г. — камчадалов) о размерах круглопера. Они «в один голос утверждали», что рыба вырастает с кита и переворачивает рыбацкие лодки.

Неприметная рыба привлекла к себе так много внимания, как ни одна другая. Ее называют рыбой-жабой, прилипалой, для командорцев это — аюхашка (от алеутского *айух'ах'*). Но ни в одном из названий не фигурирует имя Стеллера, ее первооткрывателя.

«Ящер Стеллера»

«Ящером Стеллера» называли «курьезную» рыбу *Alepisaurus ferox* (Lowe, 1833). У нее гладкое ланцетовидное тело с огромным спинным плавником и крупной головой. Не менее примечательны острые кинжаловидные зубы и большие небесно-голубые глаза. В родовом названии *a-* переводится как отрицание, *lepi-* (*λεπί-*) — «чешуя», *saurus* (*σαυρος*) — «ящер», получается «бесчешуйный ящер»; *ferox* — значит «воинственный, неукротимый». Стеллер также считал его опасным хищником. Англоязычные народы называют рыбу lancetfishes (-ланцет), handsawfishes (-ножовка) и wolffishes (-волк). На Камчатке она была известна как «зубатка» [23, с. 49]. Научная версия более нейтральна — длиннорылый, или большеголовый алепизавр.

Паллас терялся в догадках, к какому таксону отнести это странное существо, поэтому высказался осторожно: возможно, новая рыба принадлежит к *Truttaccos Salmones* («агрессивному лососю») [16, р. 383–384]. Текст об алепизавре не похож на описание вида, скорее, это отсылка к наблюдениям Стеллера. Натуралист подробно изложил все, что знал об «удивительной

по строению и форме» рыбе и на правах первооткрывателя назвал ее *Plagyodus*, или *Plagyodon*(t). Как и большинство других, слово имеет древнегреческие корни: *πλάγι-* значит «косой», *δόντ-* — «зуб», получается «косозуб». Рыба, действительно, имеет приметные внутрь-наклоненные зубы. По какой-то причине Паллас счел этот термин несовершенным (*imperfect*), но своего варианта не предложил.

Стеллер был первым, кто собрал и засушил тихоокеанскую форму алепизавра. Его выбросило морем на один из северных Курильских островов, когда натуралист посещал их в 1743 г. [21, р. 533] Но первая зафиксированная встреча с «рыбой-медузой» (*jelly fish*) состоялась раньше, 22 октября 1703 г. у западного побережья Африки на 6°36' с.ш. и 19°57' з.д. Запись об этом можно найти в отчете Уильяма Фаннелла [3, р. 8]. Во время легендарного похода Дампьера 1703–1704 гг. Фаннел находился на борту «Св. Георгия». По мнению современных систематиков, тихоокеанская форма немного отличается от атлантической, что может послужить поводом для разделения их на подвиды [1, р. 484–487].

Название *Alepisaurus ferox* появилось благодаря британскому священнику и натуралисту Ричарду Томасу Лау (Lowe). 27 августа 1833 г. на заседании Лондонского зоологического общества был заочно заслушан его доклад «Описание алепизавра, нового рода рыб» [9, р. 104], текст сопровождался цветным рисунком. Коллекционный экземпляр поступил годом ранее, летом 1832 г. его выбросило на берег о. Мадейры.

Позже вид записывали как *A. aesculapius* (Bean, 1883), *Plagiodus aesculapius* (Günther, 1867) и *P. ferox* (Soldatov et Lindberg, 1930). Все три варианта делают отсылку к Стеллеру, поскольку во время походов он и был эскулапом, то есть врачом. Но ни один не укоренился.

На сегодняшний день об алепизавре известно немного. Это крупный батипелагический вид (до 2,08 м в длину), держащийся на глубинах более 100–200 м и иногда поднимающийся для кормления к поверхности. Его можно встретить почти повсеместно, кроме полярных морей: в Средиземноморье, Северной и Южной Атлантике и в Тихом океане. В желудках хищника находят осьминогов, кальмаров, оболочников, ракообразных и других рыб, таким способом было открыто немало новых видов.

Волосозуб Стеллера

Рыба известна как *Trichodon trichodon* (Tilesius, 1813): корень *trich-* происходит от древнегреческого *τρίχης* — «волос», *don* — от *δόντι*, «зуб». В России ее так и называют — северным волосозубом. Вид можно встретить в Беринговом море и северной части Тихого океана до залива Сан-Франциско на востоке и о. Хоккайдо на западе. Поскольку рыбка предпочитает песчаные и илистые грунты, ее английское название — *pacific sandfish*.

Первые экземпляры волосозуба были собраны Стеллером 10 июня 1744 г. Рыба найдена в морских выбросах на песчаном берегу Авачинской бухты. В большом количестве ее находили возле мысов Лопатки, Кронок (Кроноцкого) и Шемячик (вероятно, мыса Памятник близ устья реки Семьячик). Карл Мерк, участник экспедиции Биллингса 1785–1793 гг., привез образцы с Алеутских островов и отметил обилие рыбы на о. Уналашке.

Вид описал Тилезиус [13, р. 466–468, tab. XV], но его манера изложения носила, скорее, полемичный характер. Раздел вышел под заглавием «*Trachinus gasteropelecus* или *Trichodon Stelleri*», а иллюстрация подписана «*Trachinus trichodon*». С одной стороны, Тилезиус представил не только новый вид, но и новый род — *Trichodon*, этот род признан современными систематиками. С другой, он ставил под сомнение его существование, полагая, что речь может идти всего лишь о новом виде рода *Trachinus*. Но право первой руки в данном случае принадлежит не Тилезиусу, а Стеллеру. Именно Стеллер записал: «*Trichodon est novum genus piscis ex ordine acanthopterygiorum*» («*Trichodon* — это новый род рыбы порядка *Acanthopterygiorum*») и перечислил отличительные признаки. Тилезиус считал утверждение Стеллера ошибочным

и аргументировал тем, что он не вспомнил морского дракона *Trachini Draconis* (обитателя Северного моря *Trachinus draco* (Linnaeus, 1758)). Дальнейшие рассуждения противоречивы: Тилезиус сравнивал строение черепа с *Trachinus*, а грудную часть и брюшной плавник — с *Salmonigasteropeleco* Палласа [15, p. 50, tab. 3] и т. д.

Больше всех относительно этой исторической несправедливости сокрушался американский зоолог Леонард Стейнегер [21, p. 421, 533, 536], ярый поклонник Стеллера. Как и следовало ожидать, *Trachinus* и *Trichodon* были признаны не просто разными родами, но и отнесены к разным семействам (*Trachinidae* и *Trichodontidae* соответственно).

Положение дел пытался исправить французский естествоиспытатель Жорж Кювье. В публикации 1829 г. [2, p. 152-158] он назвал подход Тилезиуса недопустимым и привел полное описание, сделанное Палласом по дневникам Стеллера. Текст содержал обоснование, по каким именно признакам натуралист выделил рыбу из числа прочих. Вид был переименован в *Trichodon stelleri*, и какое-то время зоологи использовали это название. В их числе был Гребницкий: «*Trichodon Stelleri* C. & V. <...> Пожираются молодью топорков. Весною, когда *Trichodon* приваливает к берегам для метания икры, она служит пищею трески. Мечет икру в марте, апреле. <...> Водится в песчаных местах (зарывается в песок), поросших водорослями, к которым и прикрепляет икру, склеенную неправильными комками. Икрынки с толстыми оболочками. Икра поедается жителями [командорцами] сырою и вареною» [24, с. 331–332]. Такую же информацию получил Мерк на Лисьих (Алеутских) островах. В XVIII в. камчадалы называли рыбку 'ашактамиш (лат. *uaschaktamysch*), а восточные алеуты — *анамхлих*' (лат. *anamchlyk*). Оба слова были утрачены, но сохранился созвучный алеутский топоним *Anamxix* — это скала на о. Канага и островок возле о. Амчитки.

К сожалению, с триходоном, алеписавром и круглопером имя Стеллера не связывают уже много лет. Забыта и предыстория. Но в наших силах пересмотреть события последних столетий и, по крайней мере, восстановить хронологию.

Список литературы

1. Anderson W. W., Berry F. H., Böhlke J. E., Bolin R. L., Gehringer J. W., Gibbs R. H., Gosline W. A., Marshall N. B., Mead G. W., Rofen R. R., Wilimovsky N. J. *Orders Iniomi and Lyomeri: Lizardfishes, Other Iniomi, Deepsea Gulpers / Fishes of the Western North Atlantic. Part 5. New Haven, Connecticut: Yale Peabody Museum of Natural History, 2018. 664 p.*
2. Cuvier G., Valenciennes M. *Histoire naturelle des poissons. T. 3. Paris: Chez F. G. Levrault, 1829. 300 p.*
3. Funnell W. *A Voyage Round the World, Containing an Account of Captain Dampier's Expedition into the South Seas in the Ship St George in the Years 1703 and 1704 // A Collection of voyages. London: W. Botham, 1729. 481 p.*
4. Garman S. *The Discoboli: Cyclopteridae, Liparopsidae, and Liparididae. Cambridge, 1892. 96 p.*
5. Günther A. *Catalogue of the fishes in the British Museum. Vol. 3. London: British Museum (Natural History), 1861. 586 p.*
6. Jordan D. S., Evermann B. W. *A check-list of the fishes and fishlike vertebrates of North and Middle America: extracted from Report of Commissioner for 1895. App. 5 // Bulletin of the United States Fish Commission. Washington: Government printing office, 1896. 767 p.*
7. Jordan D. S., Evermann B. W. *Fishes of North and Middle America: A descriptive catalogue of the species of fish-like vertebrates found in the waters of N. A. north of the Isthmus of Panama. Part. 2 // Bulletin of U. S. National Museum. No. 47. Washington: Government Printing Officer, 1898. 2183 p.*
8. Jordan D. S., Gilbert C. H. *Description of a New Agonoid Fish (Brachiopsis xyosternus), from Monterey Bay, California // Proceedings of the United States National Museum. Washington: Smithsonian Institution Press, 1880. P. 152-154.*
9. Lowe R. T. *Description of Alepisaurus, a new genus of fishes // The Proceedings of the Zoological Society of London. Pt. 1. London, 1833. P. 104.*

10. Mecklenburg C. W., Sheiko B. A. Family Cyclopteridae Bonaparte 1831 — lumpsuckers // *Annotated Checklists of Fishes*. No 6. San Francisco: California Academy of Sciences, 2003. 17 p.
11. *Mémoires de l'Académie Impériale des sciences de St. Pétersbourg*. T. 2: avec l'histoire de l'Académie pour les années 1807 et 1808. St. Pétersbourg: de l'Impérie de l'Académie Impériale des sciences, 1810. 562.
12. *Mémoires de l'Académie Impériale des sciences de St. Pétersbourg*. T. 3: avec l'histoire de l'Académie pour les années 1809 et 1810. St. Pétersbourg: de l'Impérie de l'Académie Impériale des sciences, 1811. 563.
13. *Mémoires de l'Académie Impériale des sciences de St. Pétersbourg*. Tome 4: avec l'histoire de l'Académie pour les années 1811. St. Pétersbourg: de l'Impérie de l'Académie Impériale des sciences, 1813. 568.
14. Pallas P. S. *Spicilegia zoologica: quibus novae imprimis et obscurae Animalium species, iconibus, descriptionibus atque commentariis illustrantur*. Vol. 7. Berolini, 1769. 42 p.
15. Pallas P. S. *Spicilegia zoologica: quibus novae imprimis et obscurae Animalium species, iconibus, descriptionibus atque commentariis illustrantur*. Vol. 8. Berolini, 1770. 54 p.
16. Pallas P. S. *Zoographia Rosso-Asiatica: sistens omnium animalium in extenso Imperio Rossico, et adjacentibus maribus observatorum recensionem, domicilia, mores et descriptiones, anatomen atque icones plurimorum*. Vol. 3. Petropoli: Officina Caes. Academiae Scientiarum Impress, 1814. 428 p.
17. Pennant T. *Introduction to the Arctic Zoology*. Vol. 3. London: printed for R. Faulder, 1792 (downing 1.03.1788). 342 p.
18. Pietsch T., Orr J., *Fishes of the Salish Sea: a compilation and distributional analysis* // *The NOAA Professional Paper NMFS*. Seattle: Scientific Publications Office, National Marine Fisheries Service, 2015. 106 p.
19. Sheiko B. A., Mecklenburg C. W. Family Agonidae Swainson 1839 — poachers // *Annotated Checklists of Fishes*. No 30. San Francisco: California Academy of Sciences, 2004. 27 p.
20. Steindachner F. *Ichthyologische Beiträge (X)* // *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Classe*. Vol. 83. Wien: K.-K. Hof- und Staatsdruckerei in Commission bei C. Gerold's Sohn, 1881. P. 179-219.
21. Stejneger L. *Georg Wilhelm Steller, the Pioneer of Alaskan Natural History*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1936. 623 p.
22. Steller G. W. *Observationes generales universam histonam piscium concernentes* // *Novi Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae*. T. III. Petropoli, 1753. P. 405-420.
23. Барабаиш-Никифоров И. И. В стране ветров и туманов. М.; Л.: Всесоюзное кооперативное объединенное издательство, 1934. 92 с.
24. Гребницкий Н. А. Список рыб, водящихся у о-вов Командорских и п-ова Камчатки // *Вестник рыбопромышленности: Орган Императорского Российского Общества Рыбоводства и Рыболовства*. Т. XII. Вып. 6-7. 1897. С. 323-339.
25. Даль В. И. *Толковый словарь живаго великорусскаго языка*. Т. 4. СПб., М.: Издание М.О. Вольфа, 1882. 704 с.
26. Крашенинников С. П. *Описание земли Камчатки (с приложением рапортов, донесений и других неопубликованных материалов)*. М.; Л.: Изд-во Главморпути, 1949. 841 с.
27. Парин Н. В., Евсеенко С. А., Васильева Е. Д. *Рыбы морей России: аннотированный каталог*. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2014. 733 с.
28. Стеллер Г. В. *Дневник плавания с Берингом к берегам Америки 1741-1742 / под ред. А. К. Станюковича*. М.: Изд-во ПАН, 1995. 224 с.
29. Стеллер Г. В. *Описание Земли Камчатки*. Петропавловск-Камчатский: ХК «Новая книга», 2011. С. 13-405.
30. Шейко Б. А. Видовой состав морской ихтиофауны акватории Командорских островов (предварительные результаты): Научный отчет. СПб., 2005, на правах рукописи.
31. Шмидт П. Ю. *Рыбы восточных морей Российской империи*. СПб.: Типогр. М. Стасюлевича, 1904. 466 с.

Научное издание

AUS SIBIRIEN — 2019

НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ СБОРНИК

В авторской редакции
Компьютерная верстка
Компьютерный
дизайн обложки
Печать цифровая
Печать офсетная

Н. С. Власова

Е. Г. Шмакова

А. В. Башикиров

В. В. Торопов, С. Г. Наумов



Подписано в печать 21.04.2020. Тираж 100 экз.
Объем 19,53 усл. печ. л. Формат 60×84/8. Заказ 188.

Издательство Тюменского государственного университета
625003, г. Тюмень, ул. Семакова, 10
Тел./факс: (3452) 59-74-68, 59-74-81
E-mail: izdatelstvo@utmn.ru